

BACCALAURÉAT GENERAL
EPREUVE SPECIFIQUE DES SECTIONS EUROPENNES
MATHEMATIQUES – ITALIEN

Corrigé du sujet 3

Esercizio

Da indagini conoscitive è noto che il 15% di autovetture di una nota marca avrà bisogno di cambiare la frizione entro i 100.000 km percorsi. Si scelgono 20 autovetture della stessa marca.

Chiamiamo X , la variabile aleatoria che indica il numero di autovetture tra le venti che avranno bisogno di cambiare la frizione.

1. Dare i valori che può prendere X .
2. Qual è la distribuzione di probabilità di X ? Dare i parametri.
3. Calcolare il valore atteso $E(X)$ e interpretare il risultato.
4. Con l'aiuto della calcolatrice, calcolare la probabilità (arrotondata al millesimo) che :
 - a. tre autovetture debbano cambiare la frizione.
 - b. nessuna debba cambiare la frizione.
 - c. al massimo cinque autovetture debbano cambiare la frizione.
 - d. almeno 7 autovetture debbano cambiare la frizione.

Correzione

1. Chiamiamo X , la variabile aleatoria che indica il numero di autovetture tra le venti che avranno bisogno di cambiare la frizione.

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 19, 20\}$$

2. Consideriamo la ripetizione di 20 esperimenti di Bernoulli identici e indipendenti. La probabilità di scegliere una autovettura per la quale c'è bisogno di cambiare la frizione è 0,15.

La distribuzione di probabilità di X è la distribuzione binomiale $B(20; 0,15)$.

3. Il valore atteso $E(X)$: $E(X) = 20 \times 0,15$, $E(X) = 3$ significa che se ripetiamo un gran numero di volte l'estrazione di 20 autovetture della stessa marca, in media, otteniamo 3 autovetture che avranno la necessità di cambiare la frizione.

4. Arrotondato al millesimo :

- a. $P(X = 3) \approx 0,243$
- b. $P(X = 0) \approx 0,039$
- c. $P(X \leq 5) \approx 0,933$
- d. $P(X \geq 7) = 1 - P(X \leq 6)$, $P(X \geq 7) \approx 0,022$